

Tabelle 54: Gefäßversuche zur Salz-Empfindlichkeit einiger Pflanzenarten (1988)

Pflanzen- art	Ertrags- faktoren	0	mg/l NaCl 220	440	Signifikanz F-Wert
<u>Wirsing</u>	gTG/Pfl.	20.53	16.00	12.41	2.86 -
<u>Salat</u>	gTG/Pfl.	9.41	10.24	9.62	0.24 -
<u>Tabak</u>	gTG Sandblatt/Gef.	7.18	7.31	8.08	1.23 -
	gTG Hauptgut/Gef.	6.48	6.70	6.54	0.09 -
	gTG Obergut/Gef.	6.75	6.84	4.45	12.53 **
	gTG Gesamt	20.41	20.85	19.07	1.45 -
<u>Lauch-</u>	gFG/Gef.	20.19	20.16	14.08	1.94 -
<u>Gurken</u>	gTG/Gef. (Sproß+Früchte)	148.30	122.8	74.86	5.27 **
<u>Busch- bohnen</u>	gTG Hülsen/Gef.	8.66	2.85	2.02	97.11 **
<u>Öllein</u>	gTG Samen/Gef.	7.46	7.49	4.92	15.56 **
	gTG Fasern/Gef.	6.29	5.93	4.95	10.82 **

<u>Verwendete Sorten:</u>			
<u>Wirsing:</u>	"Vorbote"	<u>Salat:</u>	"Salinas cindy"
<u>Tabak:</u>	"Badischer Burley"	<u>Poree:</u>	"Eskimo"
<u>Buschbohnen:</u>	"Toga"	<u>Gurken:</u>	"Bingo"
<u>Öllein:</u>	"Antares"		

Anmerkung:

gTG/Gef. = g Trockengewicht pro Gefäß